

2 maanden vaccinatie

RVP Monitor 2022

DKTP-Hib-HepB

DKTP: difterie-kinkhoest-tetanus-polio
Hib: Haemophilus influenzae type b
HepB: hepatitis B



5790

vragenlijsten ingevuld

348

kinderen hebben vaccin tegen DKTP-Hib-HepB gekregen*



232

klachten gemeld

49%

heeft ten minste 1 klacht gemeld


* De DKTP-Hib-HepB vaccinatie wordt alleen bij 2 maanden gegeven als de moeder geen 22wekenprik heeft gekregen of als het medisch noodzakelijk is.

Welke klachten komen het meest voor?*


Prikplaats
Koorts
 Huilen Hangerigheid
 Verhoging

** Hoe groter een woord is, hoe vaker deze klacht is gerapporteerd door deelnemers. Klachten na vaccinatie die door tenminste 3% van de deelnemers gerapporteerd zijn worden getoond.


Hoe belastend zijn de meest voorkomende klachten gemiddeld?***



Wanneer ontstaan de meest voorkomende klachten? De meeste klachten treden binnen 24 uur na vaccinatie op.



Hoe lang duren de meest voorkomende klachten? De meeste klachten verdwijnen vaak binnen 1 tot 2 dagen.



*** Benieuwd naar alle resultaten? Lees dan [hier het bijbehorend rapport](#).